

LAS RAPACES

105 Rapaces
para Colombia

Gallinazos
6 especies

Águilas y gavilanes
52 especies

Halcones
18 especies

Búhos
28 especies

Lechuza
1 especie

Zona Andina

15 especies son migratorias

44 especies
Andinas

Gallinazos
3 especies

Águilas y gavilanes
29 especies

Halcones
12 especies

Búhos
19 especies

Lechuza
1 especie

Grupos

Las rapaces se encuentran en una gran diversidad de ambientes terrestres, y se dividen en dos grupos:



Diurnas
Gallinazos, águilas y halcones
76 especies

Nocturnas
Búhos y lechuzas
29 especies


Vista aguda
4 a 8 veces más potente que la del humano

Pico curvo y fuerte
Sirve para desgarrar a sus presas



Garras fuertes y puntiagudas

Se alimentan de estos animales



¿CÓMO NOS AYUDAN LAS RAPACES?

Las rapaces como águilas, halcones y búhos pueden ser muy importantes para nosotros, ya que:

- Son organismos en el tope de las redes tróficas, controlando algunas especies que pueden afectar a las personas y sus cultivos.
- Nos ayudan a monitorear los ecosistemas, debido a que son muy sensibles a los cambios en el ambiente.
- Aquellas que se alimentan de animales muertos como los gallinazos, gualas y cóndores nos ayudan a eliminar malos olores y previenen que se esparzan enfermedades que pueden tener los animales muertos.

AMENAZAS PARA LAS RAPACES

Pérdida, degradación y fragmentación de hábitat

El aumento de la agricultura ha generado la disminución de los hábitats nativos de los que dependen las rapaces, como resultado las poblaciones del águila crestada (*Spizaetus isidori*) en Colombia se han reducido en más del 60%. Esta es la amenaza más grande que enfrentan las aves rapaces.

Cambio climático

El cambio climático es causado por las actividades humanas. Este fenómeno ocasiona cambios en los patrones climáticos como la lluvia, vientos, temperatura, etc; alterando a su vez los ecosistemas de los cuales las rapaces dependen.

Conflicto con comunidades

La disminución del bosque y ocupación de estos espacios por comunidades humanas genera que las rapaces cacen animales de corral, lo que lleva a un conflicto donde las rapaces comienzan a ser cazadas. La caza por conflicto es considerada la principal amenaza para las poblaciones de águila crestada en Colombia.

El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos es una iniciativa conjunta de la Agencia Francesa de Desarrollo, la Conservación Internacional, la Unión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón, la Fundación MacArthur y el Banco Mundial. La meta fundamental es asegurar que la sociedad civil se dedique a conservar la diversidad biológica.

Asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas en Colombia - Calidris
Carrera 24 #4-20. Barrio Miraflores
Teléfono: 5560455
www.calidris.org.co
Cali-Colombia

Diseño, ilustraciones y diagramación:
Naturaleza Creativa • www.naturalezacreativa.org

Impresión:
Ingeniería Gráfica S.A.

Las especies incluidas en esta guía se encuentran por encima de los 1.500 m.s.n.m

Las especies ilustradas no están a escala real



Guía de las Rapaces

más comunes de los Andes de Colombia




Cathartiformes
Cathartidae



Guala
Cathartes aura
<2600 m.s.n.m.

Gallinazo
Coragyps atratus
<4000 m.s.n.m.



Cóndor andino
Vultur gryphus
300-5000 m.s.n.m.

Accipitriformes
Pandionidae



Águila pescadora
Pandion haliaetus
<4000 m.s.n.m.


Accipitriformes
Accipitridae



Caracolero selvático
Chondrohierax uncinatus
<3000 m.s.n.m.



Gavilán maromero
Elanus leucurus
<3500 m.s.n.m.



Tijereta
Elanoides forficatus
<3500 m.s.n.m.



Águila crestada o águila real de montaña
Spizaetus isidori
1500-3500 m.s.n.m.



Gavilán maromero
Elanus leucurus
<3500 m.s.n.m.



Águila coronada
Spizaetus ornatus
<2400 m.s.n.m.



Águila iguenera
Spizaetus tyrannus
<2000 m.s.n.m.



Águila coliblanca
Geranoaetus albicaudatus
<2500 m.s.n.m.



Gavilán caminero
Rupornis magnirostris
<2700 m.s.n.m.



Águila paramuna
Geranoaetus melanoleucus
1600-3500 m.s.n.m.



Águila de Swainson
Buteo swainsoni
<3500 m.s.n.m.



Gavilán caminero
Rupornis magnirostris
<2700 m.s.n.m.



Gavilán rabcortito
Buteo brachyurus
<3000 m.s.n.m.



Águila de Swainson
Buteo swainsoni
<3500 m.s.n.m.



Águila aliancha
Buteo platypterus
<3500 m.s.n.m.



Gavilán rabcortito
Buteo brachyurus
<3000 m.s.n.m.



Caracara
Caracara cheriway
<3300 m.s.n.m.



Águila aliancha
Buteo platypterus
<3500 m.s.n.m.



Gavilán rabcortito
Buteo brachyurus
<3000 m.s.n.m.



Caracara
Caracara cheriway
<3300 m.s.n.m.



Águila aliancha
Buteo platypterus
<3500 m.s.n.m.



Gavilán rabcortito
Buteo brachyurus
<3000 m.s.n.m.



Caracara
Caracara cheriway
<3300 m.s.n.m.

Falconiformes
Falconidae



Halcón reidor, culebrero o guaco
Herpethotes cachinnans
<2500 m.s.n.m.



Pigua
Milvago chimachima
<2700 m.s.n.m.



Caracara
Caracara cheriway
<3300 m.s.n.m.



Halcón peregrino
Falco peregrinus
<3500 m.s.n.m.



Halcón aplomado
Falco femoralis
<2000 m.s.n.m.



Halcón murcielaguero
Falco rufigularis
<2600 m.s.n.m.

Strigiformes
Strigidae



Currucutú común
Megascops choliba
<2700 m.s.n.m.



Búho de anteojos
Pulsatrix perspicillata
<1800 m.s.n.m.



Lechuza
Tyto alba
<3500 m.s.n.m.

Buhío nubícola
Glaucidium nubicola
1400-2200 m.s.n.m.

Muy pequeño
VU

Categorías UICN

NT Casi amenazada

VU Vulnerable

EN En peligro

CR En peligro crítico